

¿Demasiado mayor para tomar jarabe? ¿Demasiado joven para tragar pastillas?

ZYRTEC® Masticables para Niños son perfectos



Use los productos solo como se indica.

Para niños que han superado la medicina líquida pero no están listos para tragar una pastilla, los masticables ZYRTEC® para Niños son la opción perfecta.

- Alivio para los peores síntomas de alergia de su hijo(a), en interiores y exteriores
- Alivia estornudos, goteo nasal, ojos irritados y acuosos y picazón de nariz o garganta
- Una dosis dura 24 horas
- Disponible en dosis de 2.5 mg para niños de 2 años o más y dosis de 10 mg para niños de 6 años o más

Poderoso alivio de la alergia en un masticable con mucho sabor



Los sabores de ZYRTEC® para Niños están respaldados por nuestra Garantía de sabor! Escanee para obtener más información o visite ZyrtecProfessional.com





Productos ZYRTEC® para Niños

Alivio consistente y potente en una dosis diaria



Use los productos solo como se indica.

EDAD	ZYRTEC® JARABE ANTIALÉRGICO PARA NIÑOS	ZYRTEC® TABLETAS SOLUBLES PARA NIÑOS	ZYRTEC® MASTICABLES PARA NIÑOS 10 MG	ZYRTEC® MASTICABLES PARA NIÑOS 2.5 MG
Adultos y niños de 6 años o más	5 ml o 10 ml una vez al día, según la gravedad de los síntomas. No se deben tomar más de 10 ml en 24 horas.	Una tableta de 10 mg una vez al día. No se debe tomar más de una tableta de 10 mg en 24 horas. Un producto de 5 mg puede ser apropiado para síntomas menos graves.	Se debe masticar y tragar 1 tableta (10 mg) una vez al día; no se debe tomar más de 1 tableta (10 mg) en 24 horas. Un producto de 5 mg puede ser apropiado para síntomas menos graves.	Se deben masticar y tragar 2 tabletas (5 mg) o 4 tabletas (10 mg) una vez al día, dependiendo de la gravedad de los síntomas; no se deben tomar más de 4 tabletas (10 mg) en 24 horas.
Adultos de 65 años o más	5 ml una vez al día; no tome más de 5 ml en 24 horas.	Consulte con un médico	Consulte con un médico	Mastique y trague 2 tabletas (5 mg) una vez al día; no tome más de 2 tabletas (5 mg) en 24 horas.
Niños de 2 años hasta menos de 6 años	2.5 ml una vez al día. Si es necesario, la dosis se puede aumentar a un máximo de 5 ml una vez al día o 2.5 ml cada 12 horas. No administre más de 5 ml en 24 horas.	Consulte con un médico	Consulte con un médico	Se debe masticar y tragar 1 tableta (2.5 mg) una vez al día; si es necesario, la dosis se puede aumentar a un máximo de 2 tabletas (5 mg) una vez al día o 1 tableta (2.5 mg) cada 12 horas. No administre más de 2 tabletas (5 mg) en 24 horas.
Niños menores de 2 años	Consulte con un médico	Consulte con un médico	Consulte con un médico	Consulte con un médico
Consumidores con enfermedad hepática o renal	Consulte con un médico	Consulte con un médico	Consulte con un médico	Consulte con un médico

ml = mililitro

Consulte el envase del producto ZYRTEC® para obtener instrucciones de dosificación completas.

*Entre los antihistamínicos orales de venta libre.